

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

DLP 15-9-75 784864

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

ÉDITION DE LA STATION DE BOURGOGNE

ABONNEMENT ANNUEL : 50 F.

ET FRANCHE-COMTÉ - CÔTE-D'OR - SAÔNE-ET-LOIRE - YONNE - NIÈVRE - JURA - DOUBS - HAUTE-SAÔNE - TERRITOIRE DE BELFORT

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Z. I. Beaune-Savigny - 21206 BEAUNE - Tél. (80) 22.19.38

Régistré au greffe de la Direction Départementale de l'Agriculture - C. C. P. DUON 3405.12 K

! ATTENTION : Notre nouvelle !  
! adresse postale !  
! Z. I. Nord - 21206 BEAUNE !

Bulletin N° 46 - SEPTEMBRE 1975

12 Septembre 1975

## COLZA

LIMACES : Les attaques de limaces risquent de s'intensifier et de causer de graves dommages dans les jeunes semis du fait des rosées abondantes, des brouillards nocturnes et des chutes de pluie.

Leur présence peut être facilement décelée en soulevant dans la journée les pierres ou les mottes sous lesquelles elles se cachent ; dans le doute il suffit d'épandre quelques poignées d'un granulé antilimace et de vérifier dès le lendemain l'importance de la population.

Les dommages peuvent être sensiblement réduits en épandant des granulés à base de méthaldéhyde : Antilimace granulé, Limagrain, Agrolimace etc... 15 à 30 kg/ha ou de méthiocarbe : Mesurool antilimace 3 kg/ha si les conditions climatiques ne sont pas trop défavorables.

GROSSES ALTISES DU COLZA : Le piégeage ayant permis la capture de ces insectes dès la levée des colzas, il convient de surveiller les jeunes semis. Dès que l'apparition des altises sera constatée ou que les dommages seront observés, le traitement des cultures est conseillé en employant l'un des insecticides suivants :

methidathion (Ultracide)	250 g. matière active à l'hectare
phosalone (Azofène, Zolone, etc...)	1000 g. matière active à l'hectare
oléoparathion	(200 g. matière active à l'hectare).

L'Ingénieur chargé  
des Avertissements Agricoles :

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie  
Chef de la Circonscription  
"Bourgogne et Franche-Comté"

J. PETIOT.

G. VARLET.

7485

.../...

POSSIBILITES DE REMPLACEMENT D'UNE CULTURE DE COLZA D'HIVER ACCIDENTEE

DESHARBEE AVEC UN DES HERBICIDES SUIVANTS (D'APRES LES FICHES ACTA édition MARS 1975)

Matière active	Déconseillées	Possibles	Possibles avec restrictions
DIALATE (Avadex en ) (présemis)		lin oléagineux Pomme de terre colza de prin- temps, Tournesol orge de printemps, légumineuses four- ragères, pois, haricot, betteraves	
NAPROPAMIDE (Devrinol en ) (présemis )	fèverole, blés, avoine, orge, graminées fourra- gères, betteraves lin oléagineux, soja.	chou, pomme de terre, colza de printemps, tour- nesol. lin oléagineux, soja.	- après un labour à 20 cm effectué à la sortie de l'hiver : pois, haricot, lu- zerne, trèfle, maïs. - sans nouveau traitement : colza de prin- temps, tournesol.
NITRALIN (Planavin 75PM) (en présemis )	céréales d'hiver maïs, ray grass, betteraves	colza, tourne- sol, pomme de terre, lentille chou, cultures fourragères, soja, lin olé- agineux.	- après un labour normal : blé et orge de printemps
TRIFLURALINE (Tréflan en ) (présemis )	céréales d'hiver avoine, bettera- ves, navet, grami- nées fourragères	orge, tournesol fèverole, trèfle pomme de terre pois, haricot, luzerne, ail, chou, lentille tomate repiquée lin oléagineux	- après un labour profond et des façons superficielles avant le semis : blés de printemps. - Sans nouveau traitement : colza de prin- temps, soja. - maïs
CARBETAMIDE (Legurame PM ) (en postlevée)	avoine, blés, or- ge, lin oléagi- neux, betteraves		- après un labour de retournement : dans le mois qui suit le traitement : luzerne, trèfle, pois, lentille, fève- role, chou, chicorée, colza de printemps tournesol - deux à deux mois et demi après le trai- tement : pomme de terre - deux mois et demi à trois mois après le traitement : maïs
PROPYZAMIDE (Kerb 50 ) (en postlevée)	épinard, céréales	colza de prin- temps, tourne- sol, soja, pois haricot, salade ail, endive.	- en cas de traitement à l'automne et après un labour (15 - 20 cm) avec retournement : pomme de terre, maïs, betteraves, luzerne.
PROPYZAMIDE + DIURON (Kerb Ultra en ) (postlevée) 4 - 5 feuilles.	épinard, céréales lin oléagineux.	colza de prin- temps, tourne- sol, soja, pois haricot.	- en cas de traitement à l'automne et après un labour (15 - 20 cm) avec retour- nement : pomme de terre, maïs, betteraves luzerne, endive, salade.